Neue Beiträge zur systematischen Insektenkunde

Herausgegeben als Beilage zur „Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie“ von H. Stichel, Berlin, und redigiert unter Mitwirkung von **G. Paganetti-Hummler**, Vöslau, Nieder-Oesterreich.

Das Blatt erscheint nach Bedarf in zwangloser Folge und kann nur in Verbindung mit der „Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie“ bezogen werden.

Band II. **Berlin, 15. März 1922.** **Nr. 8.**

Die Käfer in Panzers „Fauna insectorum Germanicae initia“.

Von **Otto Rapp**, Erfurt. — (Fortsetzung aus Nr. 7.)

III.

	Im Kataloge:	Im Panzer:	
	25. *Lathridiidae.*		
441	*Enicmus minutus* L.	*Dermestes porcatus* Pnz.	23,8
442	*Cartodere ruficollis* Mrsh.	*Cryptophagus ruficollis* Pnz.	99,13
443	*Corticaria longicornis* Hbst.	*Dermestes longicornis* Pnz.	23,10
	26. *Mycetophagidae.*		
444	*Triphyllus bicolor* F.	*Mycetophagus punctatus* F.	12,12
445	*Mycetophagus 4pustulatus* L.	„ *4maculatus* F.	12,9
446	„ *piceus* F.	„ *piceus* Hellw.	1,22
447	„ „ *a. lunaris* F.	„ „ *varietas* Hellw.	2,7(5)
448	„ *atomarius* F.	„ *atomarius* F.	12,10
449	„ *multipunctatus* F.	„ *multipunctatus* F.	12,11
450	„ *fulvicollis* F.	„ *fulvicollis* Zenker	62,4
451	„ *populi* F.	„ *brunneus* Pnz.	57,21
452	*Litargus connexus* Geoffr.	*Ips marginalis* Pnz.	2,24
—	„ „ „	*Mycetophagus signatus* Pnz.	57,20
	27. *Cisidae.*		
453	*Hendecatomus reticulatus* Hbst.	*Anobium reticulatum* Creutzer	35,7
454	*Cis nitidus* Hbst.	„ *nitidum* F.	10,9
455	„ *boleti* Scop.	„ *boleti* F.	10,7
456	„ *micans* F.	„ *micans* F.	10,8
457	„ ***festivum* Pnz.**	„ *festivum* Block.	6,7
458	***Rhopalodontus fronticornis* Pnz.**	*Apate fronticornis* Fröl.	98,7
	28. *Colydiidae.*		
459	*Colydium elongatum* F.	*Colydium elongatum* F.	3,17
460	„ *filiforme* F.	„ *filiforme* F.	104,10
461	*Aulonium trisulcum* Geoffr.	„ *sulcatum* F.	104,9
462	*Ditoma crenata* F.	*Monotoma crenata* F.	1,24
463	*Synchita humeralis* F.	*Lyctus inglandis* F.	5,17
464	*Orthocerus clavicornis* L.	*Hispa mutica* L.	1,8
465	***Oxylaemus cylindricus* Pnz.**	*Lyctus cylindricus* Creutzer	35,18
466	*Teredus cylindricus* Ol.	„ *nitidus* F.	6,18
467	*Cerylon histeroides* F.	„ *histeroides* F.	5,16
	29. *Endomychidae.*		
468	***Sphaerosoma pilosum* Pnz.**	*Tritoma pilosa* Hellw.	7,8
469	*Lycoperdina bovistae* F.	*Galleruca bovistae* F.	8,4
470	„ *succincta* L.	*Endomychus 4pustulatus* Hellw.	44,18
471	*Mycetina cruciata* Schall.	*Galleruca cruciata* F.	8,5
472	*Endomychus coccineus* L.	*Endomychus coccineus* F.	44,17

III.

	Im Kataloge:	30. *Coccinellidae.*	Im Panzer:	
473	*Epilachna 11 maculata* F.		*Coccinella Argus* Scrib. (*undecimmaculata* F.)	79,4
474	*Cynegetis impunctata* L.		„ *impunctata* L.	36,4
475	*Adonia variegata* a. *constellata* Laich.		„ *7 notata* F.	79,5
476	*Adalia conglomerata* L.		„ *conglomerata* F.	106,3
477	„ *bipunctata* L.		„ *bipunctata* F.	106,1
478	„ *7 punctata* L.		„ *7 punctata* F.	79,3
479	**Coccinella hieroglyphica a. areata Pnz.**		„ *areata* Pnz.	24,7
480	„ *14 pustulata* L.		„ *14 pustulata* F.	106,7
481	„ *conglobata* L.		„ *conglobata* F.	106,5(4)
482	„ *Doublieri* a. *4 punctata* Pontopp		„ *marginepunctata* F.	79,1
483	*Anatis ocellata* L.		„ *ocellata* F.	79,6
484	„ „ a. *hebraea* L.		„ *6 lineata* F.	85,8
485	*Halyzia 16 guttata* L.		„ *16 punctata* F.	79,2
486	*Thea 22 p.* a. *20 punctata* F.		„ *20 punctata* F.	106,2
487	*Calvia 14 guttata* L.		„ *14 guttata* F.	106,6(5)
488	*Propylaea 14 p.* v. *fimbriata* Sulz.		„ *conglomerata* var. F. (*duodecimpustulata* F.)	106,4(6)
489	*Platynaspis luteorubra* Goeze		*Scymnus 4 pustulatus* Kug.	24,8
490	*Hyperaspis campestris* Hbst.		*Coccinella lateralis* Pnz.	24,9
491	*Pullus ferrugatus* Moll.		„ *analis* F.	13,3
492	**„ subvillosus a. pubescens Pnz.**		*Scymnus pubescens* Pnz.	24,13
493	*Scymnus nigrinus* Kug.		„ *nigrinus* Kug.	24,12
494	„ *frontalis* F.		„ *bipustulatus* Schneid.	24,10
495	„ *interruptus* Goeze		*Coccinella frontalis* F.	13,4
496	„ *rubromaculatus* Goeze		*Tritoma flavipes* Pnz.	2,4
—	„ „ „		*Coccinella parvula* F.	13,2
497	*Nephus 4 maculatus* Hbst.		„ *bisbipustulatus* F.	13,5
498	„ *bipunctatus* Kug.		„ *bipunctatus* Kug.	24,11
499	*Rhizobius litura* F.		„ *Aurora* Creutzer	36,5
500	*Coccidula scutellata* Hbst.		*Chrysomela scutellata* F.	26,12
501	„ *rufa* Hbst.		„ *pectoralis* F.	78,5
502	**Lithophilus connatus Pnz.**		*Tritoma connata* Creutzer	36,18
		31. *Helodidae.*		
503	*Helodes minuta* L.		*Cistela pallida* F.	8,7
504	„ „ **v. laeta Pnz.**		„ *laeta* Pnz.	8,8
505	„ **marginata v. nimbata Pnz.**		„ *nimbata* Pnz.	24,15
506	**Cyphon padi v. discolor Pnz.**		*Cyphon discolor* Pnz. (*pallidus* Pnz.)	99,8
507	*Scirtes hemisphaericus* L.		„ *haemisphaericus* F.	96,7
508	„ **orbicularis Pnz.**		*Galleruca orbicularis* Pnz.	8,6
		32. *Dryopidae.*		
509	*Potamophilus acuminatus* F.		*Parnus acuminatus* F.	6,8
510	*Dryops auriculatus* Geoffr.		„ *prolifericornis* F.	13,1
511	„ *Ernesti* Gozis.		„ *auriculatus* Kug.	38,23
512	**Latelmis Volckmari Pnz.**		*Dytiscus Volckmari* Hellw.	7,4
		33. *Georyssidae.*		
513	*Georyssus crenulatus* Rossi		*Trox dubius* Pnz.	62,5
		34. *Heteroceridae.*		
514	*Heterocerus marginatus* F.		*Heterocerus marginatus* F.	23,11
515	„ *fenestratus* Thunbg.		„ *laevigatus* Pnz.	23,12

III.

	Im Kataloge:	Im Panzer:	
	35. *Dermestidae.*		
516	*Dermestes murinus* L.	*Dermestes murinus* F.	40,10
—	„ „ „	„ *catta* Pnz.	40,11
517	*Attagenus piceus* v. *megatoma* F.	„ *macellarius* F.	40,9
518	„ *punctatus* Scop.	„ *20 guttatus* F.	22,1
519	*Megatoma undata* L.	„ *undatus* F.	75,13
520	*Globicornis nigripes* F.	„ *rufitarsis* Creutzer	35,6
—	„ „ „	„ *nigripes* F.	97,5
521	*Anthrenus pimpinellae* F.	*Anthrenus pimpinella* F.	100,1
522	„ *scrophulariae* L.	„ *scrophulariae* F.	3,11
523	„ *verbasci* L.	„ *verbasci* F.	100,2
—	„ „ „	„ *varius* F.	100,3
524	*Trinodes hirtus* F.	„ *hirtus* F.	11,16
525	*Orphilus niger* Rossi	„ *glaber* Creutzer	35,11
	36. *Nosodendridae.*		
526	*Nosodendron fasciculare* Ol.	*Byrrhus fascicularis* Pnz.	24,2
	37. *Byrrhidae.*		
527	*Simplocaria semistriata* F.	*Byrrhus semistriatus* Hellw.	25,2
—	„ „ „	„ *minutus* Hellw.	25,3
528	*Morychus aeneus* F.	„ *aeneus* F.	91,3
529	*Pedilophorus nitidus* Schall.	„ *nitens* Pnz.	25,4
530	„ *auratus* Dftschm.	„ „ „	110,11
531	*Cytilus sericeus* Forst.	„ *varius* F.	32,3
532	*Byrrhus fasciatus* Forst.	„ *fasciatus* F.	32,1
533	„ *pustulatus* Forst.	„ *morio* Kug.	37,15
—	„ „ „	„ *dorsalis* F.	104,3
534	„ *pilula* L.	„ *pilula* L.	4,3
—	„ „ „	„ *ater* F.	32,2
535	„ *luniger* Grm.	„ *luniger* Megerl.	110,8
—	„ „ „	„ *lineatus* Strm.	110,10
536	„ *glabratus* Heer.	„ *ornatus* Pnz.	24,1
537	„ **signatus Pnz.**	„ *Dianae* F.	104,2
—	„ „ „	„ *signatus* Strm.	110,9
538	„ *gigas* F.	„ *gigas* F.	104,1
539	*Porcinolus murinus* F.	„ *murinus* Hellw.	25,1
—	„ „ „	„ *undulatus* Kug.	37,14
	38. *Cebrionidae.*		
540	*Cebrio gigas* F.	*Cebrio gigas* F.	5,10
	39. *Elateridae.*		
541	*Adelocera punctata* Hbst.	*Elater atomarius* F.	76,1
542	„ *lepidoptera* Gyll.	„ *lepidopterus* Pnz.	76,4
543	„ *fasciata* L.	„ *fasciatus* F.	76,2
—	„ „ „	„ *taeniatus* Pnz.	76,5
544	„ *quercea* Hbst.	„ *varius* F.	76,3
545	*Corymbites virens* Schrnk.	„ *signatus* Pnz.	77,5
546	„ „ v. *inaequalis* Ol.	„ *aulicus* Pnz.	77,6
547	„ *pectinicornis* L.	„ *pectinicornis* F.	77,1
548	„ *cupreus* F.	„ *cupreus* F.	77,2
549	„ „ v. *aeruginosus* F.	„ „ var. F	77,3
550	„ *purpureus* ♂ Poda	„ *haematodes* ♂ F.	77,7
—	„ „ ♀ „	„ „ ♀ „	77,8
551	„ *castaneus* L	„ *castaneus* F.	77,4
552	**Selatosomus nigricornis Pnz.**	„ *nigricornis* Pnz.	61,5
553	„ *melancholicus* F.	„ *melancholicus* F.	93,11

	Im Kataloge:	III.	Im Panzer:	
554	*Selatosomus latus* F.	*Elater latus* F.		93,7
555	„ *cruciatus* L.	„ *cruciatus* F.		76,6
556	„ *bipustulatus* L.	„ *bipustulatus* F.		76,10
557	*Dolopius marginatus* L.	„ *sticticus* Pnz.		77,9
558	*Agriotes aterrimus* L.	„ *aterrimus* F.		101,15
559	„ ***ustulatus* v. *flavicornis* Pnz.**	„ *flavicornis* Pnz.		61,6
560	„ *lineatus* L.	„ *striatus* F.		93,13
561	*Ludius ferrugineus* L.	„ *ferrugineus* F.		10,10
562	*Cryptohypnus riparius* F.	„ *riparius* F.		34,12
563	*Hypnoidus pulchellus* L.	„ *pulchellus* F.		76,8
564	*Cardiophorus gramineus* Scop.	„ *thoracicus* F.		6,12
565	„ *rufipes* Geoffr.	„ *rufipes* F.		93,14
566	*Melanotus punctolineatus* Pelerin.	„ *niger* F.		101,16
567	*Heteroderes crucifer* Rossi	„ *crucifer* Rossi		76,7
568	*Drasterius bimaculatus* Rossi	„ *bimaculatus* F.		76,9
569	***Ischnodes sanguinicollis* Pnz.**	„ *sanguinicollis* Hellw.		6,13
570	*Elater sanguineus* L.	„ *sanguineus* L.		5,13
571	„ *praeustus* F.	„ *praeustus* F.		93,8
572	„ *sanguinolentus* Schrnk.	„ *ephippium* F.		5,14
573	„ *balteatus* L.	„ *balteatus* F.		93,9
574	*Limonius pilosus* Leske	„ *pilosus* F.		93,10
575	„ ***parvulus* Pnz.**	„ *parvulus* Pnz.		61,7
576	*Pheletes aeneoniger* Deg.	„ *Bructeri* Hellw.		34,13
577	*Harminius undulatus* Deg.	„ *trifasciatus* Hellw.		3,14
578	*Athous rufus* Deg.	„ *rufus* F.		10,11
579	„ *vittatus* F.	„ *vittatus* F.		98,6
580	„ *longicollis* Ol.	„ *longicollis* F.		93,12
581	*Denticollis rubens* Piller	„ *rubens* Pnz.		8,10
582	„ *linearis* L.	„ *bicolor* Pnz.		8,11
583	„ „ a. *mesomelas* L.	„ *mesomelas* L.		7,6
	40. *Eucnemidae.*			
584	*Melasis buprestoides* L.	*Melasis flabellicornis* F.		3,9
585	*Trixagus dermestoides* L.	*Dermestes adstrictor* Hellw.		75,15
586	*Drapetes biguttatus* Piller	*Elater cinctus* Kug.		31,21
	41. *Buprestidae.*			
587	*Chalcophora mariana* Lap.	*Buprestis mariana* F.		101,9
588	*Perotis lugubris* F.	„ *lugubris* F.		1,21
589	*Dicerca berolinensis* Hbst.	„ *berolinensis* F.		68,16
590	„ *acuminata* Pall.	„ *acuminata* F.		68,20
591	*Poecilonota rutilans* F.	„ *rutilans* F.		22,8
592	*Buprestis aurulenta* L.	„ *aurulenta* F.		101,10
593	„ *rustica* L.	„ *rustica* F.		68,19
594	„ *9maculata* L.	„ *flavomaculatum* F.		22,9
—	„ „ „	„ *9maculata* F.		68,17
595	*Eurythyrea austriaca* L.	„ *austriaca* F.		90,7
	(Bild: *quercus* F.; s. Bem.: Umschlag von Heft 90.)			
596	*Melanophila picta* v. *decastigma* F.	*Buprestis decostigma* F.		29,18
—	„ „ „ „ „	„ „ „		29,19
597	„ *acuminata* Deg.	„ *appendiculata* F.		68,22
598	*Phaenops cyanea* F.	„ *tarda* F.		68,21
599	*Anthaxia hungarica* Scop.	„ *cyanicornis* F.		29,22
600	„ *manca* F.	„ *manca* F.		22,10
601	„ ***candens* Pnz.**	„ *candens* Pnz.		1,9
602	„ *salicis* F.	„ *salicis* F.		1,12
603	„ *nitidula* L.	„ *nitidula* F.		101,13
—	„ „ „	„ *laeta* F.		101,14
604	*Acmaeodera flavofasciata* Pill.	„ *taeniata* F.		90,6
605	*Chrysobothris chrysostigma* L.	„ *chrysostigma* F.		68,18

III.

	Im Kataloge:	Im Panzer:	
606	*Coraebus undatus* F.	*Buprestis pruni* Pnz.	29,21
607	„ *rubi* L.	„ *rubi* F.	29,20
608	„ *lampsanae* Bon.	„ *sinuata* Creutzer	35,13
609	„ ***graminis* Pnz.**	„ *graminis* Megerl	66,8
610	*Agrilus biguttatus* F.	„ *biguttata* F.	90,8
611	„ *viridis* L.	„ *viridis* F.	101,11
612	„ „ v. *linearis* F.	„ *linearis* F.	101,12
613	„ *hyperici* Creutz.	„ *hyperici* Creutzer	67,18
614	*Trachys minuta* L.	*Trachys minuta* F.	95,8
615	*Habroloma nana* Hbst.	„ *nana* F.	95,9
	42. *Lymexylidae.*		
616	*Hylecoetus dermestoides* L.	*Lymexylon dermestoides* F.	22,2
—	„ „ „	„ *proboscideum* F.	22,3
617	„ „ v. ♂ *Marci* L.	„ *barbatum* F.	22,4
618	„ *flabellicornis* Schneid.	„ *flabellicorne* Schneid.	13,10
619	*Lymexylon navale* L.	„ *navale* F.	22,5
—	„ „ „	„ *flavipes* F.	22,6
	43. *Bostrychidae.*		
620	*Psoa viennensis* Hbst.	*Psoa viennensis* F.	96,3
621	*Bostrychus capucinus* L.	*Apate capucinus* F.	43,18
622	*Lichenophanes varius* Ill.	„ *gallica* Dufourii	101,17
623	*Sinoxylon perforans* Schrk.	*Sinodendron muricatum* F.	35,17
624	„ ***chalcographum* Pnz.**	*Bostrychus chalcographus* L.	15,4

(Fortsetzung folgt.)

Eine neue Zoocecidie durch Rhinoncus pericarpius L. an Artemisia vulgaris.

Von **H. Schleicher**, Hamburg.

Bei einer kleinen Exkursion am 4. 9. 21 nach Boberg bei Hamburg fiel mir am dortigen Geestabhang ein großes Exemplar der A. vulgaris auf. Der mittlere Trieb der sonst vollwüchsigen Pflanze schien nicht ganz so frisch zu sein als die Seitentriebe. Eine Untersuchung, die sich nach und nach bis auf den Wurzelhals erstreckte, zeigte dann unmittelbar unter der Erdoberfläche eine ungefähr dreiviertel des Wurzelumfanges und gegen 2 cm lang messende Anschwellung. Die vorsichtige Oeffnung dieser Galle zeigte dann mehrere senkrechte, gegen 2 mm Durchmesser haltende Röhren, an deren unterem Ende sich entweder Larve, Puppe oder Imago von *Rhinoncus pericarpius* L. befanden. Das Flugloch, das durch einen kleinen, im Winkel stehenden Gang die Verbindung mit der Außenwelt herstellte, war auch gleichzeitig der Anfang der Fraßröhre. Diese war zum Teil mit Exkrementen und Bohrmehl angefüllt.

Die mehrkammerige Galle enthielt im ganzen 2 Imagines, 3 Larven und 2 Puppen. Die 3 Larven waren erwachsen, auch verfärbte sich die eine Puppe, sodaß der Käfer wahrscheinlich als Imago in der Galle überwintert.

Reitter, Fauna Germanica V, 176 gibt als Futterpflanzen Polygonum- und Rumex-Arten an, mithin als Lebensbedingung nasses Terrain. Die A. vulgaris, die also auch neu als Futterpflanze ist, stand, gut 500 m

vom nassen Marschboden (Steinbeker Moor) entfernt, auf trockenem Geestabhang. Kunht, Bestimmungstabellen, nennt nur Blumen als Aufenthalt des Käfers.

Darboux et Houard, Catalogue systématique u. s. w. und H. Ross, Pflanzengallen, führen keine ähnliche Galle an Artemisia auf, kennen *Rhinoncus* als Gallenerzeuger nicht.

Falls nach Durchsicht der speziellen Literatur sich ergeben sollte, daß Larve und Puppe noch unbeschrieben sind, werde ich dieses an dieser Stelle nachholen.

Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Chrysomeliden.

Von **Georg Reineck**, Berlin. — (Mit 11 Abbildungen.)

1. *Donacia thalassina* Germ.

Eine auffällige Form aus Turkestan zeigt tiefblaue Färbung der Flügeldecken (Fld.), des Kopfes und des Halsschildes (Hlsch.), sowie auch der Unterseite und der Beine. Die Unterseite ist außerdem silberig-weiß behaart (bei der Nominatform goldig-gelb). Sie mag den Namen f. *coerulea* führen.

2. *Chrysomela violacea* Schall. = *coerulans* Scriba und *Chrys. menthastri* Suffr.

In Reitters Fauna Germanica, IV. Bd., p. 118, stellt Reitter die *menthastri* als var. zu *coerulans* und fügt die Fußnote hinzu: Bei keinem Autor findet man solche Merkmale angegeben, welche genügend wären, diese Form von *coerulans* sicher spezifisch zu unterscheiden. In einem kleinen Quertale der Ilm, dem Hengstbach bei Weimar i. Thür., beobachtete ich *Chrys. violacea* seit dem Jahre 1890 stets auf Mentha-Arten. Seit dem Jahre 1918 trat nun sonderbarerweise an der gleichen Lokalität plötzlich *Chrys. menthastri* auf, so auch in dem Sommer 1921. Dies brachte auch mich zunächst zur Annahme, daß Reitters Ansicht die richtige sei.

Eine genaue Untersuchung beider Formen, besonders auch der Geschlechtsunterschiede der ♂♂, bewies das Gegenteil. Es handelt sich um 2 gute Arten und J. Weises Angabe im Coleopterorum Catalogus, 12. *Chrysomelinae*, welcher beide als Arten aufführt, ist die richtige.

Abgesehen von den äußerlichen Unterschieden, welche Weise (Naturgesch. d. Ins. Deutschlands, VI. Bd.) und Reitter angeben, ist auch der Bau des Penis beider Arten recht verschieden, von Reitter allerdings nicht beachtet worden. Weise gibt hierüber an:

Penis von *Chrys. violacea* Schall.

P. kaum so lang als die 4 letzten Segmente, stark gekrümmt, oben wenig zusammengedrückt, fast gleich breit, vorn zuerst allmählich gerundet-verengt, dann in eine schmale und kurze, in der Mitte leicht eingeschnittene Spitze verlängert.

Penis von *Chrys. menthastri* Suffr.

Der P. stimmt in der Form mit dem von *coerulans* und *graminis* überein, erscheint aber vorn in eine lange Spitze ausgezogen, weil jede Seite der langen Oeffnung ziemlich tief bogenförmig ausgerandet ist, vor dieser Ausrandung ist er mit abgerundeten Ecken plötzlich abgestutzt.

Weises Beschreibungen werden durch meine Abbildungen im ganzen bestätigt. Bemerken möchte ich nur, daß der Bau des Penis von *violacea* von dem Bau des Penis der *menthastri* schon durch äußerlich stärker gekrümmte, kürzere und gedrungenere Form abweicht, wie aus den Abbildungen ersichtlich ist. Hinsichtlich des Baues der Oeffnungen, welche die hauptsächlichsten Unterscheidungsmerkmale zeigen, wäre zu Weises Beschreibung nichts weiter zu bemerken, als daß der Bau des Penis derselben Art von verschiedenen Lokalitäten geringe Abweichungen zeigt. **Fig. 1, 2 und 3** stellen den Penis von *menthastri* dar, und zwar **Fig. 1** solchen der Thüringer Form, **Fig. 2** die Form von Exemplaren vom Garda-See (Torbole), Bozen und Terlan, wo ich die Art in großer Zahl erbeutete, und **Fig. 3** eine Balkanform von der









Belisitze Planina, VII. 17 (von meinem Freunde Kurt Müller zahlreich gesammelt). **Fig. 4 und 5** zeigen den abweichenden Bau des Penis der *violacea*, **Fig. 5** den eines besonders kleinen ♂. **Fig. 6** und **Fig. 7** zeigen die Seitenansicht des Penisbaues beider Arten, **Fig. 6** den von *menthastri*. **Fig. 7** den von *violacea*.

Zu erwähnen wäre noch, daß der Penisbau von *violacea* und *graminis* (über letzteren berichtete ich in der Stettin. entomolog. Zeit. 1914, p. 242 u. 243 ausführlich) mehr Aehnlichkeit miteinander zeigt als der von *violacea* und *menthastri*, obgleich äußerlich und in der Färbung *graminis* und *menthastri* viel ähnlicher erscheinen.

Unter den zahlreichen Balkanexemplaren, welche Herr Kurt Müller sammelte, Treska Schlucht, VI. 17, Uesküb, VII. 18, Belisitze Planina, VII. 17, befindet sich eine Reihe von Exemplaren von dem zuletzt genannten Fundorte, welche ganz auffällig im äußeren Bau abweichen

und sich durch kurze, gedrungene, beinahe halbkugelige Gestalt des ganzen Körpers auszeichnen. **Fig. 10** zeigt ein ♂, **Fig. 11** ein ♀ dieser auffälligen neuen Form, welche den Namen f. ***semiglobosa*** führen mag. **Fig. 8 u. 9** zeigen im Gegensatz hierzu die Umrisse der normalen *Chrysom. menthastri.*

Auf die Literaturangaben von *Chrysom. violacea* und *menthastri* kann hier verzichtet werden, da dies in ausführlichster Weise im Coleopterorum Catalogus, Fam. *Chrysomelidae*, 12. *Chrysomelinae*, p. 65, 81 und 82 zu ersehen ist.

Drepana falcataria obscura Stdr.

Von **H. Stauder**, Wels.

Herr F. Wagner benennt in Z. Oest. Ent. Ver., Wien, 4. Jhrg., 1919, eine dunkle Form aus Norditalien wegen ihrer auffallenden Aehnlichkeit mit *curvatula: curvatuloides.* Diese Form ist identisch mit der in dieser Z., v. XII, 1916, p. 111, in der Arbeit „Lepidopteren aus dem Apromontegebirge" beschriebenen *D. falcataria obscura* von Polsi, *curvatuloides* Wagn. ist daher als Synonym zu *obscura* aufzufassen.

Berichtigung zu Tölg, „Beschreibung neuer Cecidomyiden".

Zu dem in den „Neuen Beiträgen zur systematischen Insektenkunde", Bd. II, 1920, p. 33—35, erschienenen nachgelassenen Aufsatz des verstorbenen Professors Dr. Franz Tölg bemerke ich, daß genannte Arbeit, um der Originalität des Autors keinen Abbruch zu tun, ungeändert zum Druck befördert wurde. Um jeder Mißdeutung zu entgehen, stelle ich fest, daß die als Cecidomyide beschriebene *Kleditoma carinata* Tölg (richtiger *Kleidotoma carinata* Tölg) nicht zu den Cecidomyiden, überhaupt nicht zu den Dipteren gehört, sondern eine Hymenoptere (Cynipide) ist. Weiter hat Dr. Tölg auf Seite 34 eine Cecidomyide als *Clinodiplosis kiefferiana* Tölg beschrieben, ein Name, der sich auf Seite 35 wiederholt, obwohl die Diagnose abweicht. Ohne mich auf die Frage der Berechtigung des Gattungsnamens *Clinodiplosis* einzulassen, will ich hier nur feststellen, daß die auf Seite 35 genannte Art einen anderen Speciesnamen führen möge. Ich erlaube mir, diese Art meinem Freunde Herrn Dr. Hans Hedicke zu widmen. Die Art hat also *Clinodiplosis hedickeana* mihi zu heißen.

Wien, im November 1921. Dr. Josef Fahringer.

Berichtigungen zu: Th. Becker, Neue Dipteren meiner Sammlung.

S. 41 Z. 5 einzuschalten „II, III" hinter „Dipt. I." — Z. 14 lies „Kertész" statt „Kertéz." — S. 44 Z. 6 „Röd." statt „Röb." — Z. 25 „Kniee" statt „Knie." — S. 46 Z. 2 „*venetianus*" statt „*venetanus.*" — S 48 Z. 13 „zeigen, auf" statt „zeigen auf". — Z. 35 das Wort „auf" gehört auf Z 36 hinter „bis." — Z. 14 v. u. „blaß" statt „qlaß."